



AD FABIA

Vesce Commune de Printemps

Vicia sativa



L'alliée de vos intercultures

PMG modéré, idéal pour un semis en association ou pour limiter les doses à l'hectare

Très productive, améliore la structure du sol (fissures verticales) et sa teneur en matières organique

DURÉE / CYCLE

4 À 6 MOIS

MORPHOLOGIE

PMG MOYEN 40 À 70 G

- ● ● ● moyen
- ● ● ● bon
- ● ● ● très bon
- ● ● ● exceptionnel

COMPORTEMENT

- ● ● ● VIGUEUR AU DÉPART
- ● ● ● FROID
- ● ● ● SÉCHERESSE
- ● ● ● RUSTICITÉ
- ● ● ● VERSE
- ● ● ● RESTRUCTURATION DES SOLS
- ● ● ● PIÉGEAGE DE L'AZOTE
- ● ● ● COMPÉTITION ADVENTICE

- ● ● ● moyen
- ● ● ● bon
- ● ● ● très bon
- ● ● ● exceptionnel

COMMENTAIRES

Excellente capacité à fixer l'azote.
Peu sensible à la sécheresse.

PRODUCTIVITÉ

- ● ● ● PRODUCTION ÉTÉ / AUTOMNE
- ● ● ● BIOMASSE
- ● ● ● PROTÉINES

- ● ● ● moyen
- ● ● ● bon
- ● ● ● très bon
- ● ● ● exceptionnel

COMMENTAIRES

Bonne capacité à produire de la biomasse. Riche en protéines.

CONSEILS DE CULTURE

PH DU SOL 6 À 8

PÉRIODE DE SEMIS (AUTOMNE) DE LA

MOISSON À FIN AOUT

PÉRIODE DE SEMIS (PRINTEMPS) MARS À

JUIN

DENSITÉ DE SEMIS (AUTOMNE) EN PUR 60

À 80 KG/HA

DENSITÉ DE SEMIS (PRINTEMPS) EN PUR 60

À 80 KG/HA

TYPE DE SOL EVITER LES SOLS TRÈS

SUPERFICIELS

PROFONDEUR DE SEMIS 2 À 5 CM

EXPLOITATION

Utilisation possible en interculture
comme en fourrage

FERTILISATION

En fonction des besoins de la
culture et des analyses de sols.

DESTRUCTION

■ ■ ■ ■ GEL (INF. -8°C)

■ ■ ■ ■ ROULAGE

■ ■ ■ ■ ROULAGE SUR GEL (INF. -8°C)

■ ■ ■ ■ BROUAGE

■ ■ ■ ■ OUTILS À DENTS

■ ■ ■ ■ OUTILS À DISQUES

■ ■ ■ ■ LABOUR

■ ■ ■ ■ CHIMIE

■ ■ ■ ■ moyen

■ ■ ■ ■ bon

■ ■ ■ ■ très bon

■ ■ ■ ■ exceptionnel

Destruction chimique du couvert interdite sauf dans certains cas particuliers, veuillez à vous renseigner sur les dérogations possibles dans votre région.