



RHODES

Radis Chinois Potager, Radis

Daïkon

Raphanus sativus L. var. niger (Mill.)

S. Kerner



Le colosse qui restructure

Tolérance améliorée face aux stress : hydromorphie notamment

Puissant pivot

Multiusages : couverts d'interculture, pour la vigne ou en pâturage

DURÉE / CYCLE

4 À 6 MOIS

MORPHOLOGIE

SYSTÈME RACINAIRE **PIVOT**

PMG MOYEN **14 G**

HAUTEUR DE VÉGÉTATION **MOYENNE**

- ● ● ● moyen
- ● ● ● bon
- ● ● ● très bon
- ● ● ● exceptionnel

COMPORTEMENT

- ● ● ● VIGUEUR AU DÉPART
- ● ● ● FROID
- ● ● ● SÉCHERESSE
- ● ● ● EXCÈS D'EAU
- ● ● ● RUSTICITÉ
- ● ● ● RESTRUCTURATION DES SOLS
- ● ● ● COMPÉTITION ADVENTICE

PRODUCTIVITÉ

● ● ● ● BIOMASSE

- ● ● ● moyen
- ● ● ● bon
- ● ● ● très bon
- ● ● ● exceptionnel

- ● ● ● moyen
- ● ● ● bon
- ● ● ● très bon
- ● ● ● exceptionnel

COMMENTAIRES

Implantation rapide et pouvoir couvrant de sa rosette.

CONSEILS DE CULTURE

PÉRIODE DE SEMIS (AUTOMNE) **FIN AOÛT À MI-OCTOBRE**

DENSITÉ DE SEMIS (AUTOMNE) EN PUR **9 KG / HA**

DENSITÉ DE SEMIS (AUTOMNE) EN MÉLANGE **1 À 3 KG / HA**

TYPE DE SOL **TOUS TYPES DE SOLS, ATTENTION AUX SOLS TRÈS COMPACTÉS**

PROFONDEUR DE SEMIS **2 À 3 CM**

DESTRUCTION

■ ■ ■ ■ GEL (INF. -8°C)

■ ■ ■ ■ ROULAGE

■ ■ ■ ■ ROULAGE SUR GEL (INF. -8°C)

■ ■ ■ ■ BROUAGE

■ ■ ■ ■ OUTILS À DENTS

■ ■ ■ ■ OUTILS À DISQUES

■ ■ ■ ■ LABOUR

■ ■ ■ ■ moyen

■ ■ ■ ■ bon

■ ■ ■ ■ très bon

■ ■ ■ ■ exceptionnel

COMMENTAIRES

Très facile à détruire mécaniquement, grâce à son pivot qui dépasse du sol. Il suffit de blesser la racine pour entraîner son pourrissement et sa destruction.

Destruction chimique du couvert interdite sauf dans certains cas particuliers, veuillez à vous renseigner sur les dérogations possibles dans votre région.