



BMR GOLD X

sorgho monocoupe ensilage
groupe 2 | 1/2 tardif



Une valeur alimentaire excellente sans apport d'amidon.

Un sorgho mâle stérile pour un apport d'énergie sans amidon, parfait complément du maïs.

Une conservation optimale de l'ensilage grâce à une teneur élevée en sucres solubles > 22 %.

Augmente le taux butyreux du lait et améliore l'état sanitaire global du troupeau.

ANNÉE D'INSCRIPTION

2013 ITALIE

ZONE DE CULTURE



● OPTIMALE ● POSSIBLE

BESOIN EN TEMPÉRATURE

SEMIS > RÉCOLTE 110 À 125 JOURS

Récolte à 30% de matière sèche
plante entière

MORPHOLOGIE

HAUTEUR MOYENNE (2,5 M)

COMPORTEMENT

● ● ● ● VIGUEUR AU DÉPART

● ● ● ● PRODUCTIVITÉ

Rendement 12 T de MS /
Ha

● ● ● ● STRESS HYDRIQUE

● ● ● ● VERSE

● ● ● ● moyen

● ● ● ● bon

● ● ● ● très bon

● ● ● ● exceptionnel

CONSEILS DE CULTURE

SEMIS À PARTIR DE 12 °C

DENSITÉ DE SEMIS SOLS SÉCHANTS 180 000 À 220 000 GRAINS / HA

DENSITÉ DE SEMIS SOLS PROFONDS 200 000 À 250 000 GRAINS / HA

DENSITÉ DE SEMIS CONDITIONS IRRIGUÉES 200 000 À 250 000 GRAINS / HA

Le sorgho ensilage est particulièrement bien adapté à la culture en dérobé après un ray-grass, un méteil ou une céréale immature, selon la date de récolte de cette première culture.

