



FENOMIX

Fauche | Ensilage

Un mélange annuel précoce et productif, pour une exploitation en monocoupe.

L'association de 2 ray-grass diploïdes, à feuilles et tiges fines.


Sa précocité d'exploitation permet l'implantation d'une culture en dérobé dans de bonnes conditions.

3 trèfles différents pour une adaptation parfaite aux conditions climatiques.




PRÉ-INOCULATION
DES LÉGumineuses
Avec le *Rhizobium*
spécifique
à chaque espèce

POIDS DE SEMENCES EN %



NOMBRE DE GRAINES EN %



37% LÉGumineuses

- MELINA - ray-grass italien non-alternatif diploïde
- ESTANZUELA - ray-grass italien alternatif diploïde
- MARAL - trèfle de Perse
- REDHEAD - trèfle incarnat
- FERTIRROSA - trèfle squarrosus
- REA - vesce velue

DURÉE

ANNUEL

CONDITIONNEMENT

20 KG

ATOUTS

Un fourrage très appétant grâce à la diversité des légumineuses.
La complémentarité des 3 trèfles assure rendement et teneur en protéines, en limitant les risques face aux aléas climatiques.
L'association de 2 ray-grass italiens et de la vesce velue permet une productivité maximale.

CONSEILS DE CULTURE

DATE DE SEMIS

SEPTEMBRE À OCTOBRE

DENSITÉ DE SEMIS

25 À 30 KG / HA

PROFONDEUR DE SEMIS

ENTRE 0,5 ET 1 CM

EXPLOITATION

Exploitation optimale en monocoupe au stade où 30 à 40 % des légumineuses sont à floraison (meilleur rapport qualité / quantité de fourrage).

Si le taux de MS est trop faible, réaliser un pré-fanage pour atteindre 30 à 40 % de MS et assurer un ensilage de qualité.

FERTILISATION

Limiter les apports d'azote compte tenu de la teneur en légumineuses (37% en nombre de graines) sous risque de réduire le développement des nodosités et la fixation d'azote.

Des apports en P et K peuvent être nécessaires en sortie d'hiver (environ 20 à 30 U de P et 60 U de K) selon les réserves du sol et le potentiel de production.