



## REDHEAD

Trèfle Incarnat

*Trifolium incarnatum*

### Vigoureux, productif et avec une haute valeur nutritive

Rustique, il demande très peu d'intervention après implantation

Culture d'implantation très facile avec une bonne biomasse ainsi qu'une grande capacité de fixation d'azote



### MORPHOLOGIE

SYSTÈME RACINAIRE **PIVOT**

PMG MOYEN **3 À 4 G**

HAUTEUR DE VÉGÉTATION **HAUTE**

### COMMENTAIRES

Son système racinaire peut descendre jusqu'à 60 cm, avec un effet restructurant sur le sol.

Hauteur en végétation de 40 à 70 cm.

### COMPORTEMENT

- VIGUEUR AU DÉPART
- FROID
- SÉCHERESSE
- EXCÈS D'EAU
- RUSTICITÉ
- RESTRUCTURATION DES SOLS
- PIÉGEAGE DE L'AZOTE
- COMPÉTITION ADVENTICE

- moyen
- bon
- très bon
- exceptionnel

### COMMENTAIRES

Enrichit le sol en azote tout en améliorant sa structure.

## PRODUCTIVITÉ

●●●● PRODUCTION PRINTEMPS

●●●● PRODUCTION ÉTÉ /  
AUTOMNE

●●●● BIOMASSE

●●●● moyen

●●●● bon

●●●● très bon

●●●● exceptionnel

## DESTRUCTION

●●●● GEL (INF. -8°C)

●●●● ROULAGE

●●●● ROULAGE SUR GEL (INF.  
-8°C)

●●●● BROYAGE

●●●● OUTILS À DENTS

●●●● OUTILS À DISQUES

●●●● LABOUR

●●●● CHIMIE

●●●● moyen

●●●● bon

●●●● très bon

●●●● exceptionnel

## COMMENTAIRES

Étant assez difficile à détruire, il faut privilégier le labour ou la destruction chimique.

Destruction chimique du couvert interdite sauf dans certains cas particuliers, veillez à vous renseigner sur les dérogations possibles dans votre région.

## CONSEILS DE CULTURE

PH DU SOL 6 À 7

PÉRIODE DE SEMIS (AUTOMNE) DU 15

AOÛT AU 30 SEPTEMBRE

PÉRIODE DE SEMIS (PRINTEMPS) DU 15

MARS À FIN AVRIL

DENSITÉ DE SEMIS (AUTOMNE) EN PUR 18 À

25 KG / HA

DENSITÉ DE SEMIS (AUTOMNE) EN

MÉLANGE 10 À 15 KG / HA

TYPE DE SOL TOUS TYPES DE SOLS

PROFONDEUR DE SEMIS 0.5 À 1 CM

## EXPLOITATION

Utilisation souple : engrais vert ou exploitation fourragère.

## FERTILISATION

En fonction des besoins de la culture et des analyses de sols

## COMMENTAIRES

Rouler après semis