



MIX 3 SOLS ACIDES À NEUTRES

SOLS ACIDES À NEUTRES

Pâture, Fauche

Pour un fourrage de qualité productif dès l'implantation.

Un fourrage riche en énergie et avec une digestibilité élevée, conçu pour les élevages laitiers.


Plus de protéines grâce à la diversité en légumineuses (5 espèces).

Un rendement fourrager élevé, bien réparti tout au long de l'année.




PRÉ-INOCULATION
DES LÉGUMINEUSES
Avec le *Rhizobium*
spécifique
à chaque espèce

POIDS DE SEMENCES EN %



NOMBRE DE GRAINES EN %



60% LÉGUMINEUSES

- RGH tétraploïde
- BELIDA - ray-grass anglais diploïde
- AMBA - dactyle
- APIS - trèfle blanc géant
- BONUS - trèfle violet diploïde
- NITRO PLUS - trèfle resupinatum
- MARAL - trèfle de Perse
- GRAN SAN GABRIELE - lotier corniculé

DURÉE

3 À 4 ANS

TYPE DE SOL

SOLS ACIDES À NEUTRES

CONDITIONNEMENT

25 KG

ATOUTS

Des légumineuses de différentes durées de vie, pour un taux de protéines assuré chaque année, dès l'implantation.

La présence de lotier qui apporte des tanins condensés (meilleure valorisation des protéines et limitation du parasitisme gastro-intestinal).

CONSEILS DE CULTURE

DATE DE SEMIS

FÉVRIER À AVRIL ET SEPTEMBRE À
OCTOBRE

DENSITÉ DE SEMIS

25 KG / HA

PROFONDEUR DE SEMIS

ENTRE 0,5 ET 1 CM

EXPLOITATION

Une première coupe ou pâture peut-être réalisée 2 à 3 mois après le semis pour homogénéiser la prairie, lorsque le développement végétatif et le climat le permettent.

Un repos hivernal entre fin novembre et février augmente le rendement fourrager. Ensuite, faucher régulièrement entre mars et octobre pour un fourrage de qualité. Veiller à laisser un talon de fauche de 8 à 10 cm pour assurer une reprise optimale.

FERTILISATION

L'apport d'azote n'est pas nécessaire car le mélange contient plus de 50% de légumineuses (en nb de graines) et se suffit à lui-même.

Des apports en P et K peuvent être nécessaires en sortie d'hiver (environ 2 à 30 U de P et 60 U de K) puis éventuellement en entretien, selon les réserves en P et K du sol ainsi que suivant le potentiel de production.