



TRIOMIX

Pâture | Fauche | Ensilage

L'alliance de la productivité et d'un fourrage de qualité.

Une bonne complémentarité des espèces pour une répartition optimale de la production dans la durée.

Permet de sécuriser son stock de fourrage avec différents modes de valorisation (ensilage, enrubannage).


Un fourrage récolté de très bonne qualité avec une teneur élevée en protéines.




NEW



POIDS DE SEMENCES EN %



NOMBRE DE GRAINES EN %



50% LÉGUMINEUSES

- PIROL - ray-grass hybride diploïde
- BONUS - trèfle violet diploïde
- MARAL - trèfle de Perse

DURÉE

2 À 3 ANS

CONDITIONNEMENT

25 KG

ATOUTS

Un mélange simple mais efficace, avec une haute teneur en légumineuses. La présence du trèfle de Perse assure le taux de protéines dès les premières coupes. Une grande polyvalence d'exploitation pour s'adapter à tous les besoins.

CONSEILS DE CULTURE

DATE DE SEMIS

FÉVRIER À AVRIL ET SEPTEMBRE À
OCTOBRE

DENSITÉ DE SEMIS

25 KG / HA

PROFONDEUR DE SEMIS

ENTRE 0,5 ET 1 CM

EXPLOITATION

La 1^{ère} année, débiter l'exploitation 2 à 3 mois après le semis. Ensuite coupes régulières. Veiller à laisser un talon de fauche de 8 à 10 cm pour assurer une reprise optimale.

Une coupe ou une pâture en sortie d'hiver permet aux plantes de s'étoffer et limite de développement des adventices (déprimage de la parcelle).

FERTILISATION

L'apport d'azote n'est pas nécessaire car le mélange contient plus de 50% de légumineuses (en nb de graines) et se suffit à lui-même.

Des apports en P et K peuvent être nécessaires en sortie d'hiver (environ 20 à 30 U de P et 60 U de K) selon les réserves du sol et le potentiel de production.