



AMOREIRAS

Vesce Velue

Vicia villosa

Une vesce pauvre en lignine pour une digestibilité maximale

Très productive, elle présente un bon développement en automne comme au printemps

Très bon comportement face à la verse en mélange type « méteil »

Pas d'effet "liane rigide" grâce à sa faible teneur en lignine, pour une récolte facilitée



DURÉE / CYCLE

6 MOIS À 1AN

MORPHOLOGIE

SYSTÈME RACINAIRE PIVOT
HAUTEUR DE VÉGÉTATION COURTE

COMPORTEMENT

- FROID
- SÉCHERESSE
- RUSTICITÉ
- MALADIES
- RESTRUCTURATION DES SOLS
- PIÉGEAGE DE L'AZOTE
- COMPÉTITION ADVENTICE

- moyen
- bon
- très bon
- exceptionnel

COMMENTAIRES

Bon couvert mellifère à floraison tardive.

Effet potentiellement bénéfique sur la fertilisation azotée de la culture suivante.

PRODUCTIVITÉ

- PRODUCTION PRINTEMPS
- BIOMASSE
- PROTÉINES

- moyen
- bon
- très bon
- exceptionnel

COMMENTAIRES

Doit être semée tôt en été si l'on souhaite produire de la biomasse avant l'hiver.

DESTRUCTION

- GEL (INF. -8°C)
- ROULAGE
- ROULAGE SUR GEL (INF. -8°C)
- BROYAGE
- OUTILS À DENTS
- OUTILS À DISQUES
- LABOUR
- CHIMIE

- moyen
- bon
- très bon
- exceptionnel

COMMENTAIRES

Il faut cependant rester attentif à leur destruction si elles sont moyennement développées, notamment avant des cultures où aucun rattrapage n'est possible car la vesce peut être envahissante.

Destruction chimique du couvert interdite sauf dans certains cas particuliers, veillez à vous renseigner sur les dérogations possibles dans votre région.

CONSEILS DE CULTURE

PH DU SOL 5.5 À 7.8
PÉRIODE DE SEMIS (AUTOMNE) MI-AOUT À OCTOBRE
DENSITÉ DE SEMIS (AUTOMNE) EN PUR 40 À 60 KG/HA
TYPE DE SOL TOUS TYPES DE SOL
PROFONDEUR DE SEMIS 2 À 5 CM

EXPLOITATION

Pour une utilisation en fourrage la vesce velue fournit une ration riche en protéines et haute en valeurs nutritives.

FERTILISATION

Cette légumineuse assure ses besoins en azote grâce aux nodosités, ainsi que ceux de la graminée potentiellement associée. L'analyse de sol reste le meilleur indicateur pour gérer les besoins des autres éléments, en fonction des objectifs et du reliquat.

COMMENTAIRES

Peut être utilisée en association pour les couverts mais à hauteur de 20% maximum, étant très agressive. Elle s'associe très bien avec du Ray-Grass Italien