



AZZURRA

Luzerne Méditerranéenne (ID 5-6)

Medicago sativa

Plus de rendement tout au long de l'année

Implantation rapide et démarrage précoce au printemps grâce au type méditerranéen

Une bonne résistance hivernale par son indice de dormance 5 - 6

Un excellent rapport feuilles/tiges, pour un fourrage de qualité



Vérifiez la disponibilité chez votre fournisseur habituel

MORPHOLOGIE

SYSTÈME RACINAIRE **PIVOT**

PMG MOYEN **2G**

COULEUR DES GRAINES **NOIRE**

HAUTEUR DE VÉGÉTATION **HAUTE**

●●●● RAPPORTE FEUILLES / TIGES

●●●● TENUE DES FEUILLES À LA RÉCOLTE

●●●● moyen

●●●● bon

●●●● très bon

●●●● exceptionnel

COMPORTEMENT

●●●● VIGUEUR AU DÉPART

●●●● FROID

●●●● RUSTICITÉ

●●●● MALADIES

●●●● VERSE

●●●● moyen

●●●● bon

●●●● très bon

●●●● exceptionnel

PRODUCTIVITÉ

- ● ● ● PRODUCTION PRINTEMPS
- ● ● ● PRODUCTION ÉTÉ / AUTOMNE
- ● ● ● BIOMASSE
- ● ● ● GRAIN
- ● ● ● PROTÉINES

-
- ● ● ● moyen
 - ● ● ● bon
 - ● ● ● très bon
 - ● ● ● exceptionnel

CONSEILS DE CULTURE

PH DU SOL > 6

PÉRIODE DE SEMIS (AUTOMNE) AVANT MI-OCTOBRE

PÉRIODE DE SEMIS (PRINTEMPS) DÈS LA REPRISE DE LA LA

VÉGÉTATION (MARS)

DENSITÉ DE SEMIS (AUTOMNE) EN PUR 20 À 25 KG/HA

DENSITÉ DE SEMIS (AUTOMNE) EN MÉLANGE 5 À 15 KG/HA (SELON LE NOMBRE DE COMPOSANTS DU MÉLANGE)

EXPLOITATION

Ne pas faire de luzerne sur un précédent luzerne (pendant 4/5 ans) pour éviter le risque allélopathique qui inhiberait l'implantation. Laisser fleurir la 2ème ou la 3ème coupe à 10% de fleurs assure la pérennité de la luzerne.

FERTILISATION

Il convient de la raisonner en fonction des effluents d'élevage apportés et de respecter la réglementation en vigueur.