



## AD FABIA

Vesce Commune de Printemps

*Vicia sativa*

### L'alliée de vos intercultures

PMG modéré, idéal pour un semis en association ou pour limiter les doses à l'hectare

Très productive, améliore la structure du sol (fissures verticales) et sa teneur en matières organique



### DURÉE / CYCLE

4 À 6 MOIS

### MORPHOLOGIE

PMG MOYEN 40 À 70 G

### COMPORTEMENT




- VIGUEUR AU DÉPART
- FROID
- SÉCHERESSE
- RUSTICITÉ
- VERSE
- RESTRUCTURATION DES SOLS
- PIÉGEAGE DE L'AZOTE
- COMPÉTITION ADVENTICE

- moyen
- bon
- très bon
- exceptionnel

### COMMENTAIRES

Excellente capacité à fixer l'azote.  
Peu sensible à la sécheresse.

## PRODUCTIVITÉ

-  PRODUCTION ÉTÉ / AUTOMNE
-  BIOMASSE
-  PROTÉINES

-  moyen
-  bon
-  très bon
-  exceptionnel

## COMMENTAIRES

Bonne capacité à produire de la biomasse. Riche en protéines.

## DESTRUCTION

-  GEL (INF. -8°C)
-  ROULAGE
-  ROULAGE SUR GEL (INF. -8°C)
-  BROYAGE
-  OUTILS À DENTS
-  OUTILS À DISQUES
-  LABOUR
-  CHIMIE

-  moyen
-  bon
-  très bon
-  exceptionnel

Destruction chimique du couvert interdite sauf dans certains cas particuliers, veillez à vous renseigner sur les dérogations possibles dans votre région.

## CONSEILS DE CULTURE

PH DU SOL 6 À 8  
PÉRIODE DE SEMIS (AUTOMNE) DE LA MOISSON À FIN AOUT  
PÉRIODE DE SEMIS (PRINTEMPS) MARS À JUIN  
DENSITÉ DE SEMIS (AUTOMNE) EN PUR 60 À 80 KG/HA  
DENSITÉ DE SEMIS (PRINTEMPS) EN PUR 60 À 80 KG/HA  
TYPE DE SOL EVITER LES SOLS TRÈS SUPERFICIELS  
PROFONDEUR DE SEMIS 2 À 5 CM

## EXPLOITATION

Utilisation possible en interculture comme en fourrage

## FERTILISATION

En fonction des besoins de la culture et des analyses de sols.