



INDIAN SUMMER

Moutarde Blanche

Sinapis alba

Une moutarde anti-nématodes tardive à floraison

Classe 2 dans les mesures officielles de l'effet anti-nématodes

Une floraison tardive, pour de la flexibilité de destruction

Une culture piège à nitrates efficace



MORPHOLOGIE

SYSTÈME RACINAIRE **PIVOT**

PMG MOYEN **6 GRAMMES**

COULEUR DES GRAINES **NOIRE**

HAUTEUR DE VÉGÉTATION **HAUTE**

COMPORTEMENT

- VIGUEUR AU DÉPART
- RUSTICITÉ
- MALADIES
- PIÉGEAGE DE L'AZOTE
- COMPÉTITION ADVENTICE

- moyen
- bon
- très bon
- exceptionnel

COMMENTAIRES

Variété à production floraison tardive, classe 2 anti-nématodes


PRODUCTIVITÉ

 BIOMASSE

 moyen

 bon

 très bon

 exceptionnel

DESTRUCTION

COMMENTAIRES

Le type de destruction ainsi que la date dépende des objectifs et de la culture à suivre. Si c'est une culture de printemps précoce comme du lin, on aura tendance à détruire le couvert précocement, autour de novembre ou décembre, afin d'éviter que la moutarde ne lignifie trop, pour ne pas créer une grosse faim d'azote. Dans le cadre d'un semis de printemps plus tardif (maïs, tournesol, sorgho), le couvert de moutarde pourra être détruit en fin d'hiver, autour de février, afin de maximiser son effet piège à nitrate, tout en ayant une période de repos assez longue avant les semis. Dans ce cas, Indian Summer est particulièrement adaptée, grâce à sa floraison tardive.

Destruction chimique du couvert interdite sauf dans certains cas particuliers, veillez à vous renseigner sur les dérogations possibles dans votre région.

CONSEILS DE CULTURE