MIX 5 OR

Pâture | Fauche

NEW

Mélange pour prairie longue durée, riche en légumineuses, directement utilisable en Agriculture Biologique.

Optimal pour la pâture.

Haut potentiel de production, permettant une charge animale élevée.

Riche en biodiversité.

PRÉ-INOCULATION DES LÉGUMINEUSES
Avec le *Rhizobium* spécifique à chaque espèce

semences bio >70%

POIDS DE SEMENCES EN %



NOMBRE DE GRAINES EN %



59% LÉGUMINEUSES

- FABIOLA BIO - ray-grass anglais diploïde
- CALIBRA BIO - ray-grass anglais tétraploïde
- LAURA BIO - fétuque des prés
- KORA BIO - fétuque élevée
- DAILE BIO - trèfle blanc intermédiaire
- CONFETTATO - trèfle fraise
- GRAN SAN GABRIELE - lotier corniculé
- BONUS - trèfle violet diploïde
- SEATON PARK - trèfle souterrain subterraneum

DURÉE

5 ANS ET PLUS

CONDITIONNEMENT

20 KG

ATOUTS

Mélange directement utilisable en Agriculture Biologique.
Production fourragère d'excellente qualité pendant plusieurs années.
Digestibilité du fourrage et teneur en protéines élevées.
Pâturage possible tout au long de l'année, avec un pic de production au printemps.
La fétuque des prés et le trèfle fraise presentent une bonne résistance à l'engorgement des sols et assurent un développement optimal de la prairie même en conditions très humides.

CONSEILS DE CULTURE

DATE DE SEMIS
FÉVRIER À AVRIL ET SEPTEMBRE À OCTOBRE

DENSITÉ DE SEMIS
25 KG / HA

PROFONDEUR DE SEMIS
ENTRE 0,5 ET 1CM

EXPLOITATION

La 1ère année, débuter l'exploitation 2 à 3 mois après le semis. Ensuite pâturage continu ou en rotation, ou coupes régulières. Veiller à laisser un talon de fauche de 8 à 10 cm pour assurer une reprise optimale.
Une coupe ou une pâture en sortie d'hiver permet aux plantes de s'étoffer et limite de développement des adventices (déprimage de la parcelle).

FERTILISATION

L'apport d'azote n'est pas nécessaire car le mélange contient plus de 50% de légumineuses (en nb de graines) et se suffit à lui-même.
Des apports en P et K peuvent être nécessaires en sortie d'hiver (environ 20 à 30 U de P et 60 U de K) puis éventuellement en entretien, selon les réserves en P et K du sol ainsi que suivant le potentiel de production.